

NUTRISON MCT

Nutrison MCT er en ernæringsmæssig komplet sondeernæring til patienter med behov for en høj andel MCT fedt, fx patienter med fedtmalabsorption. Glutenfri. Laktosefattig.

Nutrison MCT har en energitæthed på 1,0 kcal/ml. Ernæringsmæssig komplet ved 1500 ml (1500 kcal).

Nutrison MCT har et afbalanceret næringsindhold og anvendes som eneste ernæring eller som supplement til almindelig kost i henhold til ordination.

Nutrison MCT indeholder 30 E% fedt, hvoraf 60% er MCT fedt. MCT fedt fordøjes lettere end normalt fedt og kan derfor yde et vigtigt bidrag til energiindtaget.

Nutrison MCT har et øget indhold af protein (20 E%).

Nutrison MCT indeholder desuden en blanding af naturlige carotenoider.



*Nutricia skifter emballage på alle sondeernæringsprodukter. Den nye emballage bliver en plastflaske, som bl.a. er lettere at håndtere og bedre for miljøet. Læs mere på: www.nutricia.dk. Forventet skifte ses i kolonnen herunder.

VAREINFORMATION

Produkt navn	Tidligere varenr.	Nyt varenr.	Forventet skifte	Salgsenhed
Nutrison MCT	65676	635037	Uge 32 2019	8 x 1000 ml flaske

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 ML NUTRISON MCT:

Energi			Mineraler og sporstoffer		
	kJ	420	Salt	g	0,25
	kcal	100	Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)
Fedt (30,0 E%)	g	3,3	Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)
- heraf mættet	g	2,3	Chlor	mg (mmol)	125 (3,5)
- MCT	g	2,0	Calcium	mg (mmol)	80 (2,0)
- monumættet	g	0,6	Fosfor	mg (mmol)	72 (2,3)
- polyumættet	g	0,4	Fosfat	mg (mmol)	222
- linolsyre	mg	281	Magnesium	mg (mmol)	23 (0,9)
- α -linolensyre	mg	51,5	Jern	mg	1,6
(n-6)/(n-3) ratio		5,48	Zink	mg	1,2
Kulhydrat (50,0 E%)	g	12,6	Kobber	mg	0,18
- heraf sukkerarter	g	1,0	Mangan	mg	0,33
- deraf laktose	g	<0,025	Fluor	mg	0,10
polysakkarider	g	11,2	Molybdæn	μ g	10
- stivelse	g	0	Selen	μ g	5,7
andre	g	0	Krom	μ g	6,7
Kostfibre (0 E%)	g	-	Jod	μ g	13
Protein (20,0 E%)	g	5,0	Vitaminer		
nitrogen	g	0,8	Vitamin A	μ g RE	82
kasein	g	5,0	Carotenoider	mg	0,20
valle	g	0	Vitamin D	μ g	0,70
soya	g	0	Vitamin E	mg α -TE	1,3
ærter	g	0	Vitamin K	μ g	5,3
			Vitamin B ₁	mg	0,15
			Vitamin B ₂	mg	0,16
			Niacin	mg NE	1,8
			Pantothensyre	mg	0,53
			Vitamin B ₆	mg	0,17
			Folsyre	μ g	27
			Vitamin B ₁₂	μ g	0,21
			Biotin	μ g	4,0
			Vitamin C	mg	10
			Andre næringsstoffer		
			Cholin	mg	37
			Vand	ml	85
			Osmolaritet	mOsm/l	265
			Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	315
			Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	426
			Viskositet	mPa.s	10
			PH værdi	pH	6,7

Ingredienser

Vand, maltodextrin, mælkeprotein (natrium- og calciumkaseinat), vegetabiliske olier (solsikke, raps, MCT (kokosolie, palmekerneolie)), emulgator (soyalecitin), trinitratiumcitrat, magnesiumchlorid, surhedsregulerende middel (citronsyre), trikaliumcitrat, kaliumchlorid, dikaliumhydrogenphosphat, cholinchlorid, carotenoider (β -caroten, lutein, lycopene), calciumhydroxid, natrium-L-ascorbat, ferrolaktat, kaliumhydroxid, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL- α -tocopherylacetat, manganosulfat, kobberglykonat, calcium-D-pantothenat, chromchlorid, D-biotin, cholecalciferol, folsyre, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, cyanocobalamin, riboflavin, natriumselenit, natriumfluorid, kaliumjodid, phyto-menadion, natriummolybdat.

- Indikation:** Sondeernæring til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring. Til patienter med behov for en høj andel af MCT fedt, fx patienter med fedtmalabsorption. Eget som eneste kilde til ernæring.
- Dosering:** Ernæringsmæssig komplet ved 1500 ml (1500 kcal), eller som supplement til almindelig kost i henhold til ordination. Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.
- Forholdsregler:** Anvendes med forsigtighed til børn 1-6 år. Må ikke anvendes intravenøst. Koagulation i mavetarm-kanalen, fx på grund af interaktion fra lægemidler kan forekomme. Grundig overvågning er nødvendig. Må ikke fortyndes eller tilsættes medicin.
- Kontraindikationer:** Uegnet til spædbørn, patienter med galaktosæmi eller intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
- Administration:** Enteral ernæringspumpe anbefales. Ved brug af gravity set bør anvendes ch \geq 8. Omrystes inden brug og anvendes tempereret.
- Holdbarhed:** 12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.
- Opbevaring:** Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison MCT hænge 24 timer ved stuetemperatur.

Nutrison MCT er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.

Nutricia A/S | Tlf. 7021 0709 | Fax 7021 0708 | E-mail ordre@nutricia.dk | www.nutricia.dk